

DR.  
RAFAEL  
BOTELHO



CIRURGIA  
MINIMAMENTE  
INVASIVA DO  
PÉ E TORNOZELO

**CIRURGIA**  
**METATARSALGIA**  
**TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA**  
**(PERCUTÂNEA)**

ORTOPEDISTA E  
TRAUMATOLOGISTA



CIRURGIA DE PÉ  
E TORNOZELO

📞 AGENDAMENTOS: (85) 99959.1062

🌐 [WWW.DRRAFAELBOTELHO.COM.BR](http://WWW.DRRAFAELBOTELHO.COM.BR)

📷 @DRRAFAELBOTELHO

## Recomendações Pós-Operatórias

*Esta área é destinada ao paciente, onde é explicado de forma minuciosa os pós-operatórios e suas recomendações após a realização das cirurgias no pé e tornozelo. Todas essas recomendações devem ser discutidas exaustivamente no consultório, mas caso o paciente queira revisá-las ou relembra-las, elas estarão disponíveis aqui.*



### PISAR

Com o pé operado no mesmo dia da cirurgia, mas **APENAS** com a **SANDÁLIA ORTOPÉDICA (CUNHA DISTAL OU PÓS-CIRÚRGICA)**



**Clique para assistir ao vídeo de como utilizar a sandália ortopédica:**

[Cunha Distal](#)

[Pós-Cirúrgica](#)

**Onde comprar:**

[www.balancefoot.com.br](http://www.balancefoot.com.br)

[Clique para falar via Whatsapp](#)





## IMOBILIZAÇÃO

Utiliza-se a **SANDÁLIA PÓS-OPERATÓRIA** por um período de **45 dias**. Após esse período, a sandália é retirada e o paciente é liberado para pisar com calçado confortável. Autorizado para dirigir e iniciam-se as sessões de fisioterapia motora.

### **OBS:**

*A utilização da imobilização com a sandália é necessária somente para o paciente pisar e andar. Caso esteja deitado ou sentado sem apoio com membro operado, pode permanecer sem a sandália.*

**Importante:** É o médico quem faz essas liberações mediante o acompanhamento no consultório com exame físico e radiografias (RX).



Utiliza-se também um **POSICIONADOR DE DEDOS** por **45 dias**. Ele tem a função posicionar os dedos durante o pós-operatório, corrigindo a deformidade.



[Clique para assistir ao vídeo de como utilizar o posicionador de dedos](#)


**Onde comprar:**

[www.balancefoot.com.br](http://www.balancefoot.com.br)

[Clique para falar via Whatsapp](#)

**OBS:**

*A imobilização com o posicionador de dedos deve ser utilizada em tempo integral, mesmo quando estiver sem pisar, sentado, deitado ou dormindo. Sempre verificar se o posicionador está adequadamente posicionado ao longo do dia. Caso esteja afrouxado ou deslocado, deve ser reposicionado.*



**Importante:** Deve ser colocado pelo médico ou por um membro da equipe, durante a primeira troca de curativo (não deve ser utilizado no pós-operatório imediato para não sujar), e o mesmo deve ensinar o paciente a utilizá-lo da forma correta, pois é necessário retirá-lo e reposicioná-lo nas trocas de curativo e no banho.



## ATIVIDADES FÍSICAS

### **Baixo Impacto:**

Bicicleta, elíptico, musculação, hidroginástica, natação e pilates.

Liberadas **após 6 semanas**, dependendo da evolução do paciente.

### **Alto Impacto:**

Caminhadas, corridas, treino funcional, crossfit, dança e atividades esportivas.

Liberadas **após 10 semanas**, dependendo da evolução do paciente.





**Dicas para saber se sua cirurgia está indo bem e quando deve se preocupar**

## **DOR E ANALGESIA**

**0 – 24h** – No intra-operatório, bloqueios analgésicos são realizados para alívio da dor na parte de trás do joelho ou diretamente no local da cirurgia e a dor costuma não ser tão intensa.

**2° ao 7° dia** - As dores costumam se intensificar, por isso deixamos várias medicações analgésicas de rotina que podem variar de acordo com o perfil do paciente (alergias, intolerâncias e doenças associadas).



**Importante:** Anti-inflamatório + Analgésico Opióide + Analgésico comum (listados abaixo os mais utilizados pelo Dr. Rafael Botelho).

 **Anti-Inflamatórios (AINEs)**

**Flancox 500mg** Tomar 1 comprimido via oral de 12/12h por 7 dias **OU**

**Alginac Retard** Tomar 1 comprimido via oral 1x /dia por 7 dias **OU**

**Hetori 90mg** Tomar 1 comprimido via oral 1x/dia por 7 dias.

 **Analgésicos Opióides**

**Codeína + Paracetamol 30/500mg** (PACO, Codex, Tylex) – todos eles são marcas diferentes da mesma medicação). Tomar 1 comprimido de 6/6horas por 7 dias. Após esse período, a dose deve ser reduzida, sendo administrada apenas se o paciente sentir dor e no intervalo ATÉ de 6/6horas.

**OU**



**Tramadol 50mg** (Tramal 50mg Retard ou Tramadon 50mg) - Tomar 1 comprimido de 6/6horas por 7 dias. Após esse período, a dose deve ser reduzida, sendo administrada apenas se o paciente sentir dor e no intervalo ATÉ de 6/6horas.

**OU**

**Tramadol 100mg** (Tamadon Retard, Tramal Retard) – todos eles são marcas diferentes da mesma medicação). Tomar 1 comprimido de 12/12horas por 7 dias. Após esse período, a dose deve ser reduzida, sendo administrada apenas se o paciente sentir dor e no intervalo ATÉ de 12/12horas.

### **Analgésicos Comuns**

**Dipirona 1g** (Lisador Dip 1g ou Novalgina 1g) – todos eles são marcas diferentes da mesma medicação). Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 7 dias. Após esse período, a dose deve ser reduzida, sendo administrada apenas se o paciente sentir dor e no intervalo ATÉ de 6/6 horas.





**8° - 45° dia** - É normal sentir dor (tipo pontadas, latejantes, lancinantes, choques, formigamentos, queimação, dentre outras). Essas dores vão reduzindo progressivamente no decorrer do tratamento.

**Importante:** Podem ser utilizadas medicações, gelo e elevação do membro para alívio.

**45° - 90° dia OU após o início da fisioterapia motora OU após andar apoiando o membro operado** - A dor costuma regredir de forma mais rápida e perceptível (pode ocorrer leve piora transitória com a manipulação inicial do membro).

**Até 6 – 12 meses** – Costuma não ter dor, mas incômodos podem retornar transitoriamente, sem necessariamente estar ocorrendo algo de errado na cirurgia.





**Quando procurar o médico com urgência, devido à dor**

Aumento acentuado e progressivo dessas dores no decorrer dos dias, mesmo em repouso, principalmente se associado ao inchaço, vermelhidão, calor local ou alterações no aspecto da ferida operatória, como drenagem de secreção ou abertura da ferida.

***Importante:*** Caso não consiga contato com o médico, deve procurar a emergência do hospital que operou.





## EDEMA (INCHAÇO)

**0 – 15° dia** - Está presente de forma mais acentuada e constante, associado a dor e leve vermelhidão local.

**15° – 45° dia** - Está presente e costuma regredir progressivamente nesse período.

**45° – 90° dia ou após o início da fisioterapia motora ou após andar apoiando o membro operado** - Costuma regredir de forma mais rápida e perceptível (pode ocorrer leve piora transitória com a manipulação inicial do membro).

**Até 6 – 12 meses:** Pode permanecer algum grau de inchaço residual.





## **Como melhorar o inchaço no pós-operatório**

Manter o membro elevado, principalmente nas primeiras 2 semanas da cirurgia. Andar conforme orientação médica.

**Importante:** Evitar andar demasiadamente nos primeiros dias de liberação - Pode piorar o inchaço transitoriamente.


Meias elásticas compressivas de média compressão. ***Sempre com recomendação médica. Retirá-las ao deitar, dormir e tomar banho.***



## **Quando procurar o médico com urgência, devido ao inchaço**

Aumento acentuado e progressivo do inchaço, no decorrer dos dias, mesmo em repouso e com a manutenção do membro elevado, principalmente se associado ao início de dor na panturrilha ou retorno das dores de forte intensidade na região operada, vermelhidão, calor local ou alterações no aspecto da ferida operatória, como drenagem de secreção ou abertura da ferida.

**Importante:** Caso não consiga contato com o médico, deve procurar a emergência do hospital que operou.





## FERIDA OPERATÓRIA

**Antibióticos Profiláticos (1º semana)** -  
Reduz as chances de infecções superficiais de pele – É normal a ferida operatória ficar avermelhada e o curativo sujar nos primeiros dias.



**Cefalexina 500mg** – Tomar 2 comprimidos via oral de 12/12h por 7 dias

**OU**



**Amoxicilina-Clavulonato 875/125mg** – Tomar 1 comprimido via oral de 12/12h por 7 dias.

***Importante:*** Sempre prescrito pelo médico.





## TROCA DE CURATIVO

O que fazer e o que **NÃO** fazer:



**Primeiro Curativo** (realizado no centro cirúrgico):

- 1) Mantê-lo fechado até o primeiro retorno com o médico.
- 2) Protegê-lo para **NÃO** molhar durante o banho, utilizando sacos plásticos e esparadrapo.
- 3) Caso suje de sangue ou molhe – Abrir o curativo, lavar a ferida **APENAS** com soro fisiológico, enxugar com gazes secas (**NÃO** deixar a ferida úmida) e refazê-lo com gaze e crepom (não precisa ser tão volumoso quanto o primeiro e pode ser feito em casa).



4) Após a primeira troca, o curativo deve ser trocado diariamente ou, no máximo, de 2/2 dias.

5) NÃO lavar a ferida com água corrente e NÃO utilizar sabão, detergentes ou antisséptico nesse processo.

6) NÃO aplicar na ferida pomadas ou sprays, como rifocina, sem solicitação médica.

[Clique para assistir ao vídeo de como realizar a troca dos curativos](#)

 **Pontos de sutura**

**Retirados entre a segunda e a terceira semana – 14 a 21 dias** a depender da idade e do potencial de cicatrização de cada paciente. *Mais jovens – 14º dia. Mais velhos – 21º dia.*





## Quando procurar o médico com urgência, devido à ferida operatória

Alterações grosseiras no aspecto da ferida operatória, como drenagem volumosa de secreção, abertura parcial ou total ferida.

***Importante:*** Caso não consiga contato com o médico, deve procurar a emergência do hospital que operou.

